



**ANIMAL
CENTER**

Animal Center Zofia Gaińska

ul. Zamiany 12

02-786 Warszawa

Telefon: 224141812

E-mail: biuro@animal-center.pl

Zwierzę

Słonecznik ZZM

Gatunek: Kot

Rasa: Mieszaniec

Płeć: samiec

Wiek: 3 lata i 8 miesięcy

Oznakowanie:

Maść: biało bura

Właściciel

Fundacja Międzynarodowy Ruch Na Rzecz Zwierząt Viva!

Kawęczyńska 16 lok 39

03-772 Warszawa

Telefon: 790817818, 691 378 288, 785 811 792

Lekarz prowadzący: Zofia Gaińska

Historia wizyt

06/09/2017 21:46: Badanie

Temperatura: 37,7°C

Waga: 3,09 kg

Opis wywiadu: Znaleziony kilka dni temu,

Brak danych dotyczących dotychczasowego leczenia/ profilaktyki.

Wg pań nie je od trzech dni, w szpitalu bardzo chętnie zjadł saszetkę gastro

Opis badania:

odwodnienie, fałd skóry nie wraca na miejsce

spojówki zaczerwienione, rozpulchnione, obecny ropny wypływ

ślinotok, stan zapalny przyzębia, obfity kamień nazębny, gnilny zapach z jamy ustnej

węzły chłonne żuchwowe powiększone,

jama brzuszna miękka, niebolesna, jelita próżne, pogrubiłe, palpacyjnie znacznie powiększone nerki, pęcherz

moczowy znacznie wypełniony

niekastrowany

oddal mocz w kontenerze- silna woń, z domieszką krwi

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Założenie wenflonu

Pobranie krwi fundacja

Zastosowane leki

Sol 250 ml Ringer 1 szt.

WLEWNIK 1 szt.

Bunondol inj. 0,3mg/1ml 1 amp

Zalecenia:

- czekamy na wyniki badania przesiewowego krwi

- jutro pobranie moczu do badania ogólnego i mikrobiologicznego

- bunondol 0,1 ml do pyszczka

- antybiotyk do wdrożenia po wynikach badania krwi i po pobraniu moczu na posiew

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

07/09/2017 08:26: -

Zabiegi

Snap Combo Plus (felv/Fiv) 0,7

FeLV +) pozytywny !!!!!

FIV (-) negatywny

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

07/09/2017 08:45: -

Zabiegi

Vetlab - profil dla fundacji

Mocz + kreatynina

Vetlab - bakteriologia z antybiogramem

Zarejestrował: AA Laboratorium

07/09/2017 09:15: Badanie

Temperatura: 38,2°C

Opis wywiadu: Po nocy nie oddał kału

Apatia

Kicha

Opis badania:

Odwodniony, błony śluzowe różowe, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, ropne zapalenie spojówek, rana na III powiece w lewym oku (test fluoresceinowy ujemny) liczne nadżerki na języku, stomatitis, kamień nazębny, ropny wypływ z nozdrzy, nadżerka na lusterku nosa, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo zastrzony świst krtaniowy, nad płucami bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit, pęcherz moczowy znacznie wypełniony

Zła kondycja sierści, rany /otarcia na powiekach

Test bibułowy dodatni - odpchlono Fiprex

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Rtg bezdomne 2

Kroplówka w czasie wizyty

Pobranie moczu

Zastosowane leki

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 150 ml i.v.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 1 ML

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,3 ML

Inne materiały 1 szt

Difadol 0,1% krople do oczu 5ml 1 szt.

Fiprex oprysk 4 oprysk

Bunondol inj. 0,3mg/1ml 1 amp

Dawkowanie: 0,1 ml na błony śluzowe

Ornipural 2 ml

Zalecenia:

- USG jamy brzusznej

- badanie kału w kierunku pasożytów i giardii

- krople do oczu : Floxal i Difadol

- Bioimmunex 1 kaps 1xdz

- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - kroplówki i.v przez kilka dni
 - inne leki w zależności od stanu Słonecznika
 - kontrolne badanie krwi wstępnie w poniedziałek
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
- Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

07/09/2017 10:10: -

Zabiegi

[Rtg opis](#) [1 zdj](#)

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

07/09/2017 12:28: Badanie

Opis badania:

nerki wyraźnie powiększone obustronnie, wymiarów około 52x30mm, o silnie podwyższonej echogeniczności, cechach przebudowy zwłóknieniowej, narząd o nieregularnym obrysie, miedniczki bez zastoju, bez złogów, stosunek kora/rdzeń zachowanym, nadnercza bez zmian w budowie, pęcherz moczowy wypełniony znacznie moczem, w świetle pojedyncze drobne złogi tkankowe, ściana prawidłowa, wątroba miernie powiększona, o przebudowie drobnoziarnistej, podwyższonej echogeniczności, raczej o cechach pozapalnych niż zwyrodnieniowych, trzustka przebudowana, o nieregularnym obrysie, o cechach zwyrodnienia/pozapalnych? pogrubiała do 12-13mm, o niejednorodnej echogeniczności, w kierunku jej wzmożenia, żołądek o cechach pogrubienia fałdów śluzówki, warstwowość zachowana, narząd próżny, o widocznej perystaltyce, pętle jelita cienkiego o cechach pogrubienia ściany, widocznej warstwowości, w przewodzie próżny, silnie zgazowany przyściennie, o zwolnionej perystaltyce, widoczne ww chłonne krezkowe, śledzionowe, wnęki wątroby powiększone, zatarte zapalenie, kształtu elipsoidalnego, największe w korzeniu krezki około 1,3x0,8cm - konieczna kontrola, dalsza diagnostyk - BAC? bez wolnego płynu na terenie jamy otrzewnej

Zabiegi

[USG fundacja](#)

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

07/09/2017 18:15: Badanie

Opis wywiadu: Rozmowa tel z Panią Ostrowską - przekazanie wyników bad USG i zaleceń dr Zielonki.
Pani prosi o potwierdzenie białaczki PCR.
Zarejestrował: lek.wet. Aleksandra Klimczuk

08/09/2017 09:49: Badanie

Temperatura: 38,8°C
Opis wywiadu: Samopoczucie bez zmian,
Nie oddał kału, mocz oddał do kuwety,
Apetyt bardzo dobry,
Kicha

Opis badania:

śluzówki różowe, stan zapalny dziąseł, ślinotok, masywny kamień nazębny, fetor ex ore, liczne nadżerki na języku, spojówki rozpuszczalne, zaczerwienione, ropny wypływ z worków spojówkowych, nozdrza przednie zaklejone ropnym wysiękiem, nadżerka na lusterku nosowym, osłuchowo bez patologicznych szmerów nad sercem ddo, wzmożony szmer nad gdo, węzły chłonne żuchwowe powiększone, liczne otarcia na twarzy w okolicy oczu i grzbietu nosa, jama brzuszna miękka, niebolesna, przelewająca się treść, pętle jelit pogrubiałe, powiększone palpacyjnie nerki, pęcherz moczowy próżny

na końcu termometra luźny cuchnący kał- wykonano test płytkowy FPV- NEGATYWNY

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne

Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 150 ml i.v.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 1 ML

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,3 ML

Inne materiały 1 szt

Bunondol inj. 0,3mg/1ml 1 amp

Dawkowanie: 0,1 ml na błony śluzowe

TEST VETEXPERT FPV - PANLEUKO. 5SZT. 1 szt.

wynik NEGATYWNY!!!

Zalecenia:

- badanie kału w kierunku pasożytów i giardii
 - krople do oczu : Floxal i Difadol
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - kroplówki i.v przez kilka dni
 - inne leki w zależności od stanu Słonecznika
 - kontrolne badanie krwi wstępnie w poniedziałek (na prośbę p. Ostrowskiej przy okazji kontrolnego badania krwi- badanie met. PCR w kierunku obecności wirusa FeLV)
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
- Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

09/09/2017 15:54: Badanie

Temperatura: 37,2°C

Opis wywiadu: apetyt dobry, mocz oddał spore ilości, nie było kału

Opis badania:

bł.śluzowe blad różowe, lepkie

obfity kamień nazębny

nadżerki na języku

ww.chł powiększona, osłuchowo szmer nad gdo

jama brzuszna napięta, nerki bardzo powiększone, prawa bardziej, pęcherz moczowy opróżniony

wypływ z nosa i oczu, nadzferki w okolicy przysrodkowego kącika oka lewego, nadzferka na lusterku nosa,

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

[Kroplówka w czasie wizyty](#)

Zastosowane leki

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 150 ml i.v.

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 1 ML

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

Inne materiały 1 szt

Bunondol inj. 0,3mg/1ml 1 amp

Dawkowanie: 0,1 ml na błony śluzowe

Ornipural 2 ml

WLEWNIK 1 szt.

Zarejestrował: lek. wet Magdalena Kraińska- Łosek

10/09/2017 13:19: Badanie

Opis wywiadu: Bez kału po nocy. Mocz oddał.

Duża ilość wydzieliny z worków spojówkowych

Zaklezione nozdrza.

Opis badania:

W jelitach zalegające masy kałowe - odkąd jest u nas jeszcze nie oddał kału!

Podaję parafinę 3 ml

Dodatkowo:

- podano Roferon
- inhalacja
- toaleta i krople do oczu
- toaleta nosa - podałam też Flozal i Difadol do nosa.

Bunondol podano o godz 12.30

Zabiegi

[Pobył doba bezdomne](#)

[Kroplówka w czasie wizyty](#)

Zastosowane leki

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.

SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,3 ML

Inne materiały 1 szt

Bunondol inj. 0,3mg/1ml 1 amp

Dawkowanie: 0,1 ml na błony śluzowe

Intravit b 12 /inj. 100ml/ 1 ml

Ornipural 2 ml

Bioimmunex canis 40 kaps 1 szt.

OLEJ PARAFINOWY / 1 L 3 ML

Zarejestrował: lek.wet. Aleksandra Klimczuk

11/09/2017 14:16: Badanie

Temperatura: 37,8°C

Opis wywiadu: Apetyt zachowany

Kał uformowany

Kicha, utrzymują się rzeżenia

Opis badania:

Odwodniony, błony śluzowe różowe, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, rana na III powiece w lewym oku (test fluoresceinowy ujemny) nadżerki na języku, stomatitis, kamień nazębny, ropny wypływ z nozdrzy, nadżerka na lusterku nosa, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo zaostżony świst krtaniowy, nad płucami bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne
Kroplówka w czasie wizyty
Pobranie krwi fundacja

Zastosowane leki

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.
SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml
Inne materiały 1 szt
Intravit b 12 /inj. 100ml/ 1 ml
Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.
Dawkowanie: 150 ml s.c.
LOXICOM 5MG 0,15 ml.
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- po wynikach badań krwi ustalenie dalszego leczenia
- krople do oczu : Floxal i Difadol
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
- badanie kału w kierunku pasożytów i giardii
- kontrolne USG jamy brzusznej wstępnie za tydzień

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

11/09/2017 14:18: -

Zabiegi

Vetlab - profil dla fundacji
IDEXX ZAKAŻNE FELV PROGENOM DNA PCR
Zarejestrował: AA Laboratorium

12/09/2017 20:41: Badanie

Temperatura: 37,6°C

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

Kał oddał prawidłową, mocz oddaje do kuwety,ale również pod siebie.

W związku ze spadkiem poziomu mocznika we krwi dziś ostatni raz kroplówka dożylna. Ze względu na wzrost ilości postaci pałeczkowatych zmiana antybiotyku od jutra na doksycylinę.

Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt2s. Stan zapalny przyzębia , fetor ex ore.
Nadżerki na nosie i języku bez zmian.
Spojówki bladoróżowe, rozpulchnione. Węzły chłonne podżuchwowe powiększone, podkolanowe bez zmian.
Osluchowo stridor, nad ddo i sercem bez zmian.
Jama brzuszna miękka, niebolesna, nerki wyraźnie powiększone, pętle jelit pogrubiałe z wyraźnie przelewającą się treścią.

Zdjęto dziś wenflon.

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne
Kroplówka w czasie wizyty
Pobranie krwi fundacja

Zastosowane leki

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.
SYNULOX INIEKCJA / 100 ML INJ. 0,3 ml
Inne materiały 1 szt
Intravit b 12 /inj. 100ml/ 1 ml
Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.
Dawkowanie: 150 ml s.c.
LOXICOM 5MG 0,15 ml.
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- Antybiotykoterapia : Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
- Bioprotect (osłonowo) 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu : Floxal i Difadol
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
- badanie kału w kierunku pasożytów i giardii
- kontrolne USG jamy brzusznej wstępnie za tydzień

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

13/09/2017 09:36: Badanie

Temperatura: 37,5°C

Opis wywiadu: Samopoczucie trochę lepsze, apetyt zachowany,

Mocz i kał oddał, kał uformowany (zebrano 3, ostatnią próbkę do badania parazytologicznego)

W wynikach znaczny spadek parametrów czerwonych (w stosunku do ostatniego badania- po nawodnieniu?), utrzymująca się leukocytoza, spadek parametrów nerkowych (kreatynina, mocznik do wartości referencyjnych, hiperfosfatemia utrzymuje się)

obrzęk łapki w której założony był wenflon

Opis badania:

błony śluzowe różowe, wilgotne, masywny kamień nazębny, zapalenie przyzębia, fetor ex ore, nadżerki dużo bledsze

i mniejsze,
spojówki rozpułchnione, zaczerwienione, utrzymujący się wypływ- poprawa w stosunku do ostatniego badania,
nadżerka na lusterku nosowym,
wypływ ropny z nozdrzy utrzymuje się, ale nie jest już tak obfity,
węzły chłonne żuchwowe powiększone, podkolanowe bez zmian,
osłuchowo zastrzony szmer na gdo, nad ddo i sercem bez patologicznych szmerów,
jama brzuszna miękka, niebolesna, powiększone nerki, pęcherz moczowy miernie wypełniony

dzisiaj podanie kroplówki i leków sc

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne

Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.

Inne materiały 1 szt

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 150 ml s.c.

LOXICOM 5MG 0,15 ml.

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- dzisiaj w godzinach wieczornych (teraz nie jest na czczo) pobranie krwi do badania- rozmaz, retikulocyty, mycoplasma
 - Antybiotykoterapia : Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
 - Bioprotect (osłonowo) 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu : Floxal i Difadol
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
 - badanie kału w kierunku pasożytów i giardii
 - kontrolne USG jamy brzusznej wstępnie za tydzień
- Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

13/09/2017 11:25: -

Zabiegi

Kał pasożyty

Zastosowane leki

Snap IDEXX giardia 1 szt.

Wynik: ujemny

Zarejestrował: AA Laboratorium

14/09/2017 09:31: Badanie

Temperatura: 37,6°C

Opis wywiadu: Samopoczucie lepsze

Rzadziej kicha

Wypływ z nozdrzy mniej obfity

Apetyt zachowany

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, nadżerki na języku goją się, stomatitis, kamień nazębny, nadżerka na lusterku nosa, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo zaostrzony świst krtaniowy, nad płucami bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Floxal krople do oczu 0,3% 5 ml 1 szt.

Zalecenia:

- bez kroplówek
 - Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
 - Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu : Floxal i Difadol
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - w sobotę kontrolne badanie krwi morfologia z rozmazem, retikulocyty, mycoplasma
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
 - kontrolne USG jamy brzusznej w poniedziałek 18.09
- Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

15/09/2017 14:31: Badanie

Temperatura: 37,7°C

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

Kał i mocz oddaje prawidłowo.

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, wilgotne, crt2s. stan jamy ustnej bez zmian.

Spojówki różowe, węzły chłonne podżuchwowe powiększone.

Osluchowo zaostrzony szmer nad gdo, nad ddo i sercem bez zmian.

Jama brzuszna miękka, niebolesna.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- bez kroplówek
 - Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
 - Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu : Floxal i Difadol
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - w sobotę-jutro kontrolne badanie krwi morfologia z rozmazem , retikulocyty, mycoplasma
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
 - kontrolne USG jamy brzusznej w poniedziałek 18.09
- Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

16/09/2017 14:25: Badanie

Temperatura: 37,0°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt zachowany

Kał i mocz oddaje prawidłowo

Na noc pozostawiona miska z jedzeniem, rano jeszcze było w niej kilka groszków- niewiadomo kiedy zjadł i czy jest na czczo (badanie przekładamy na poniedziałek)

Opis badania:

błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, czas kapilarny w normie, kamień nazębny, zapalenie przyzębia, fetor ex ore, nadżerki na języku spływały się i zbledły

nadżerka na lusterku nosowym goi się, okolica nozdrzy czysta bez wypływu

spojówki białoróżowe, lekko rozpulchnione, niewielka ilość wypływu z worków spojówkowych,

węzły chłonne żuchwowe powiększone,

osłuchowo bez zmian,

jama brzuszna miękka, palpacyjnie powiększone nerki, pęcherz moczowy miernie wypełniony

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- w poniedziałek nie karmimy! pobranie krwi do badania (dodatkowo rozmaz, retikulocyty i mycoplasma)
- bez kroplówek
- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu : Floxal i Difadol
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz

- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
 - kontrolne USG jamy brzusznej w poniedziałek 18.09
- Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

17/09/2017 15:27: -

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

18/09/2017 08:00: Badanie

Temperatura: 37,4°C

Waga: 3,2 kg

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre

Rzadziej kicha

Apetyt zachowany

Kał uformowany

Wskaźniki czerwono krwinkowe uległy poprawie (E-4,68 , Hb- 7,73, Ht- 26)

Czekamy na wyniki Mycoplasma felis (PCR)

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, stomatitis, kamień nazębny, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo zaostrzony świst krtaniowy , nad płucami bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Pobranie krwi fundacja

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu : Floxal i Difadol
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz

- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów
 - kontrolne USG jamy brzusznej 20.09 (12 godz na czczo)
- Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

18/09/2017 08:01: -

Zabiegi

Vetlab - profil dla fundacji
VETLAB -MORFOLOGIA ROZMAZ
VETLAB -RETIKULOCYTY
VETLAB -MYCOPLASMA PCR

Zarejestrował: AA Laboratorium

19/09/2017 15:11: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

Kał średnio uformowany.

Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt2s. Kamień nazębny, fetor ex ore, stomatitis.

Spojówki rozpulchnione, niewielki wypływ z oczu.

Osluchowo zaostrzony szmer nad krtanią, nad ddo i sercem bez zmian.

Jama brzuszna miękka, niebolesna, pętle jelit nieznacznie pogrubiałe z przelewającą się treścią.

Wyraźnie powiększone nerki.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
 - Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu : Floxal i Difadol
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów (wstępnie zapisany na 27.09 -> odwołanie zabiegu jeśli Mycoplasma wyjdzie dodatnia, wtedy najpierw leczenie i dopiero zabieg)
 - czekamy na wyniki rozmazu krwi i na obecność Mycoplasma haemofelis.
 - kontrolne USG jamy brzusznej jutro-20.09 (12 godz na czczo)
 - W badaniu kału stwierdzona obecność Toxocara cati
- Odrobaczenie od dziś :
1. 3 dni podawania aniprazolu 1/3 tabl 1 raz dziennie (19-21.09)
 2. 2 tygodnie przerwy.
 3. 3 dni podawania aniprazolu (wg aktualnej wagi) (5-7.10)
 4. 4 tygodnie przerwy.

5. 3 dni odrobaczania aniprazolem (wg aktualnej wagi) (2-4.11)
 6. 4 tygodnie przerwy
 7. Kontrolne badanie kału. (od 2go grudnia)
- Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

20/09/2017 13:08: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany, kał i mocz oddaje prawidłowo.
Podano aniprazol.

Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, błyszczące. Stan jamy ustnej bez zmian.
Spojówki rozpuszczone, różowe, węzły chłonne podżuchwowe powiększone, podkolanowe bez zmian.
Osluchowo jak wczoraj.
Jama brzuszna miękka, niebolesna, pogrubiła pętle jelit.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Unidox solutab 100mg tab 1 szt.
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
 - Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu : Floxal i Difadol
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów (wstępnie zapisany na 27.09 -> odwołanie zabiegu jeśli Mycoplasma wydzie dodatnia, wtedy najpierw leczenie i dopiero zabieg)
 - czekamy na wyniki badania krwi na obecność Mycoplasma haemofelis.
 - kontrolne USG jamy brzusznej jutro-21.09 (12 godz na czczo)
 - W badaniu kału stwierdzona obecność Toxocara cati
Odrobaczanie od dziś :
 1. 3 dni podawania aniprazolu 1/3 tabl 1 raz dziennie (19-21.09)
 2. 2 tygodnie przerwy.
 3. 3 dni podawania aniprazolu (wg aktualnej wagi) (5-7.10)
 4. 4 tygodnie przerwy.
 5. 3 dni odrobaczania aniprazolem (wg aktualnej wagi) (2-4.11)
 6. 4 tygodnie przerwy
 7. Kontrolne badanie kału. (od 2go grudnia)
- Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

21/09/2017 09:47: Badanie

Temperatura: 37,0°C
Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre
Apetyt zachowany

Mocz i kał oddaje prawidłowo

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, stomatitis, kamień nazębny, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo zaostrzony świst krtaniowy, nad płucami bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Aniprazol tabl 1 szt.

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
 - Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu : Floxal i Difadol
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów (wstępnie zapisany na 27.09)
 - W badaniu kału stwierdzona obecność Toxocara cati
 - Odrobaczanie :
 - 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni (wg aktualnej wagi)
 - 4 tygodnie przerwy
 - 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni
 - 4 tygodnie przerwy
 - 2.12 kontrolne badanie kału
- Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

22/09/2017 18:59: Badanie

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, apetyt zachowany

Kał i mocz oddaje prawidłowo

Mycoplasma +

Opis badania:

błony śluzowe bladoróżowe, wilgotne, crt w normie,

stan zapalny spojówek,

węzły chłonne żuchwowe powiększone,

osłuchowo wzmożony szmer nad krtanią, nad ddo i sercem bez patologicznych szmerów

jama brzuszna miękka, niebolesna, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem
 - Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu : Floxal i Difadol
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów (wstępnie zapisany na 27.09)
 - W badaniu kału stwierdzona obecność Toxocara cati
- Odrobaczanie :
- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni (wg aktualnej wagi)
 - 4 tygodnie przerwy
 - 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni
 - 4 tygodnie przerwy
 - 2.12 kontrolne badanie kału
- Zarejestrował: lek. wet. Anna Misiak

23/09/2017 16:27: Badanie**Opis badania:**

rano wymioty po zbyt szybkim zjedzeniu karmy
na prawej konczynie piersiowej, bocznej powierzchni nadgarstka niewielka rana
poza tym jak wcześniej

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Unidox solutab 100mg tab 1 szt.
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps
CERENIA inj 0,2 ML
Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

24/09/2017 17:32: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze
mocz

Opis badania:

bez wpływu z oczu
floxal
difadol
lizyna

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Unidox solutab 100mg tab 1 szt.
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps
Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Maria Kłucjasz

25/09/2017 14:03: Badanie

Temperatura: 38,0°C

Waga: 3,35 kg

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre

Apetyt zachowany

Kał uformowany

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, zapalenie spojówek, stomatitis, kamień nazębny, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Diagnoza: FeLV +

MYKOPLAZMOZA

TOKSOKAROZA

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu : Floxal i Difadol
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów po wyleczeniu mykoplazmozy
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia

Odrobaczenie (Toxocara cati) :

- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni (wg aktualnej wagi)
- 4 tygodnie przerwy
- 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni
- 4 tygodnie przerwy
- 2.12 kontrolne badanie kału

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

26/09/2017 17:18: Badanie

Temperatura: 38,3°C

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

Kał i mocz oddaje prawidłowo.

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, wilgotne crt2s. Stan jamy ustnej bez zmian.

Spojówki rozpuszczalne, różowe, węzły chłonne podżuchwowe powiększone, podkolanowe bez zmian.

Osluchowo mruczenie.

Jama brzuszna miękka, niebolesna, pętle jelit pogrubiałe z przelewającą się treścią, nerki powiększone.

Ranki/odleżyny na stawach nadgarstkowych ładnie się goją.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu : Floxal i Difadol
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów po wyleczeniu mykoplazmozy
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia

Odrobaczenie (Toxocara cati) :

- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni (wg aktualnej wagi)

- 4 tygodnie przerwy

- 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni

- 4 tygodnie przerwy

- 2.12 kontrolne badanie kału

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

27/09/2017 10:59: Badanie

Temperatura: 37,6°C

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

Mocz oddał do kuwety, kału nie było po nocy w klatce.

Felv + -> potwierdzone PCR.

Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt1,5s. Stan jamy ustnej bez zmian, nadżerki na języku ładnie się goją.

Spojówki różowe, rozpulchnione, węzły chłonne podżuchwowe powiększone, podkolanowe bez zmian.

Osluchowo mruczenie.

Jama brzuszna miękka, niebolesna, pętle jelit pogrubiłe, nerki powiększone.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie

- krople do oczu : Floxal i Difadol
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów po wyleczeniu mykopłazmozy (początek terapii unidoxem 12.09)
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia
- Dziś kontrolne USG jamy brzusznej

Odrobaczenie (Toxocara cati) :

- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni (wg aktualnej wagi)
 - 4 tygodnie przerwy
 - 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni
 - 4 tygodnie przerwy
 - 2.12 kontrolne badanie kału
- Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

28/09/2017 10:45: Badanie

Opis wywiadu: Dziś na czczo ze względu na badanie USG (wczoraj przepełniony przewód pokarmowy). Kału nie oddał, mocz w kuwecie. Na kocyku widoczny ślad po wymiocinach lub moczu (do obserwacji).

Opis badania:

Błony śluzowe jamy ustnej różowe, wilgotne, crt1,5s. Stan jamy ustnej bez zmian.

Spojówki różowe, rozpulchnione, węzły chłonne podżuchwowe powiększone, podkolanowe bez zmian.

Osluchowo bez nieprawidłowości.

Jama brzuszna miękka, niebolesna, pętle jelit pogrubiałe, nerki powiększone.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu : Floxal i Difadol
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów po wyleczeniu mykopłazmozy (początek terapii unidoxem 12.09)
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia
- Dziś kontrolne USG jamy brzusznej

Odrobaczenie (Toxocara cati) :

- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni (wg aktualnej wagi)
- 4 tygodnie przerwy
- 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni
- 4 tygodnie przerwy
- 2.12 kontrolne badanie kału

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

28/09/2017 15:22: Badanie

Opis badania:

w kontrolnym badaniu USG bez większych zmian. Delikatne zmniejszenie nerek w stosunku do poprzedniego badania. Nadal dominującym objawem jest przewlekłe zapalenie w obrębie większości narządów jamy brzusznej.

Proszę o kontrolę dr A.Zlot

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

29/09/2017 07:42: -

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Maria Kłucjasz

30/09/2017 16:31: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany.

Po nocy znaleziono ślady wymiocin w klatce.

Kał i mocz oddaje prawidłowo.

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

01/10/2017 15:35: Badanie

Opis wywiadu: w klatce wymioty, kał uformowany,

samopoczucie dobre, zjadł chętnie,

podano unidox

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

02/10/2017 08:07: Badanie

Temperatura: 38,0°C

Opis wywiadu: Samopoczucie bardzo dobre

Apetyt zachowany

Mocz i kał oddaje prawidłowo

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, rozpulchnione spojówki, stomatitis, kamień nazębny, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

YELLOX 0.9MG/ML KROPE DO OCZU 5 ML 1 OP

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie

- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie

- krople do oczu :

* Floxal do 5.10

* Yellox przez 4 tyg (do 30.10)

- Bioimmunex 1 kaps 1xdz

- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych

- inhalacje 2xdz

- 9.10 kontrolne badanie krwi profil przesiewowy + morfologia z rozmazem (wtedy decyzja o terminie zabiegu sanacji)

- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów po wyleczeniu mykoplazmozy (wstępnie 11.10)

- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)

- kontrolne badanie USG jamy brzusznej lek wet Anna Zlot 19.10

- szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10

Odrobaczenie (Toxocara cati) :

- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni

- 4 tygodnie przerwy

- 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni

- 4 tygodnie przerwy

- 2.12 kontrolne badanie kału

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

03/10/2017 15:56: Badanie

Opis badania:

różowy, ww chł żuchwowe miernie powiększone, kamień nazębny i zap dziąsł,

osłuchowo bez zmian,
brzuch miękki, niebolesny, powiększony obrys nerek

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu :
 - * Floxal do 5.10
 - * Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz
- 9.10 kontrolne badanie krwi profil przesiewowy + morfologia z rozmazem (wtedy decyzja o terminie zabiegu sanacji)
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów po wyleczeniu mykoplazmozy (wstępnie 11.10)
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)
- kontrolne badanie USG jamy brzusznej lek wet Anna Zlot 19.10
- szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10

Odrobaczenie (Toxocara cati) :

- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni

- 4 tygodnie przerwy

- 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni

- 4 tygodnie przerwy

- 2.12 kontrolne badanie kału

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

04/10/2017 08:54: Badanie

Opis wywiadu: samopoczucie dobre, apetyt w normie

Opis badania:

błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe miernie powiększone, zapalenie przyzębia, masywny kamień nazębny,
osłuchowo w normie, brzuch miękki, niebolesny, obrys nerek powiększony

podano leki p.o.

podano krople

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Unidox solutab 100mg tab 1 szt.
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie
 - Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu :
 - * Floxal do 5.10
 - * Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - inhalacje 2xdz
 - 9.10 kontrolne badanie krwi profil przesiewowy + morfologia z rozmazem (wtedy decyzja o terminie zabiegu sanacji)
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów po wyleczeniu mykoplazmozy (wstępnie 11.10)
 - kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)
 - kontrolne badanie USG jamy brzusznej lek wet Anna Zlot 19.10
 - szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10
- Odrobaczenie (Toxocara cati) :
- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni
 - 4 tygodnie przerwy
 - 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni
 - 4 tygodnie przerwy
 - 2.12 kontrolne badanie kału

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

05/10/2017 08:28: -

Zabiegi

Vetlab - profil dla fundacji
VETLAB -MORFOLOGIA ROZMAZ
Zarejestrował: AA Laboratorium

05/10/2017 08:29: Badanie

Temperatura: 36,7°C
Waga: 3,5 kg
Opis wywiadu: Apatia
Zmniejszony apetyt
Kał uformowany

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, anizokoria, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, rozpulchnione spojówki, stomatitis, kamień nazębny, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne
Kroplówka w czasie wizyty
Pobranie krwi fundacja
Rtg bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Unidox solutab 100mg tab 1 szt.
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps
Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.
Dawkowanie: 150 ml i.v.
WENFLON NIEBIESKI 1 szt.
APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.
CERENIA inj 0,3 ML
TOLFINE / 100 ML INJ. 0,35 ML
SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.
NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 0,5 AMP.

Zalecenia:

- konieczna konsultacja neurologiczna
- konieczne badanie USG jamy brzusznej (zapisany do lek wet Anna Zlot 19.10)
- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- inhalacje 2xdz
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów po wyleczeniu mykoplazmozy (wstępnie 11.10)
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)
- szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10

Odrobaczenie (Toxocara cati) :

- 5-7.10 Aniprazol przez 3 dni
- 4 tygodnie przerwy
- 2-4.11 Aniprazol przez 3 dni
- 4 tygodnie przerwy
- 2.12 kontrolne badanie kału

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

05/10/2017 14:59: Badanie

Opis badania:

nerki miernie powiększone, o prawidłowym położeniu, nieregularnej powierzchni, wymiarów około 48x31mm, o

silnym wzmożeniu echogeniczności kory, jej pogrubieniu, silnie zatartej granicy kora/rdzeń, miedniczki bez zastoju, w mięszu obecne pojedyncze złogi o cechach mineralizacji, cechy zwłóknienia narządu, przebudowa trwała, zwyrodnieniowa/pozapalna, początkowe odcinki moczowodów bez zmian, wokół nerki lewej, dogrzebietowo, widoczny bszar o podwyższonej echogeniczności, jak zmieniona torebka tłuszczowa narządu, nadnercza bez zmian w budowie, pęcherz moczowy wypełniony moczem, ściana prawidłowa, w świetle widoczne złogi tkankowe, wolnopływające, wątroba powiększona, o niejednorodnej echogeniczności, w kierunku jej wzmożenia, początkach przebudowy zwyrodnieniowej, bez zmian rozrostowych, układ naczyniowy prawidłowy, pęcherzyk żółciowy wypełniony aechogenną żółcią, ściana prawidłowa, drogi żółciowe prawidłowe, śledziona niepowiększona, o obniżonej echogeniczności, bez zmian w mięszu, żołądek silnie przepełniony treścią pokarmową, zgazowany dość wyraźnie, ściana na widocznych obszarach o prawidłowej echogeniczności, perystaltyka zwolniona, trzustka o obniżonej echogeniczności, o nieregularnym przebiegu, grubości do 8mm, zmianach przewlekłych z cechami zaostrzenia, dwunastnica o pogrubiałej ścianie, zatartej jej echogeniczności, delikatnie poszeźronym świetle, zwolnionej perystaltyce, w świetle treść pokarmowa, dalsze pętle jelita cienkiego wypełnione znacznie treścią pokarmową, zwolnionej perystaltyce, odcinkowo widoczne obszary dające wyraźny cień akustyczny, bez odcinkowego rozszerzenia światła narządu, bez cech typowych dla ciała obcego, okrężnica zgazowana przyściennie, ściana prawidłowa, ww chłonne na terenie jamy brzusznej zmienione zapalnie przewlekłe, elipsoidalne, grubości około 1cm, bez wolnego płynu na terenie jamy otrzewnej

proszę o kontrolę dr A.Zlot
Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

05/10/2017 19:20: Badania diagnostyczne

Wykonano badania diagnostyczne.

Zabiegi

USG jamy brzusznej

Zarejestrował: lek. wet. Anna Zlot

USG

Parametr

Data badania

05/10/2017

Opis zmian (OPIS_ZM_US)

Badanie usg j brzusznej:

Wątroba powiększona, brzegi zaokrąglone, raczej gładkie, wzdłuż pasmo torebkowe, hyperechogenne, echogeniczność miąższu zauważalnie wzmożona, niejednorodna, cechy zapalenia przewlekłego, z nieznaczna komponenta zwyrodnieniowa, stłuszczeniowa. Bez wyraźnych zmian rozrostowych, ew deformujących płaty. Pęcherzyk żółciowy wypełniony aechogennie, torebka niejednorodna, wzmożona, komponenta zapalna, przewlekła, gr ok 2mm, bez zmian rozrostowych. W świetle drobne pasma/zageszczenia echogenicznej żolci, nieznaczna ilość zalegającego osadu. ukł żółciowy bez poszerzenia. W ok przy/zawnekowej, zawatrobowo, wzdłuż unaczynienia, zauważalne pojedyncze węzły chłonne, pofaldowane, gr do ok 5mm, mieszanej, zmniejszonej echogeniczności, zmienione zapalnie, przewlekłe, naciekowo, z zaostrzeniem. Podobnie zmienione naciekowo, przewlekłe, z zaostrzeniem, w ilości kilku obok siebie, w skupisku, węzły chłonne w ok srodo brzucha, korzenia krezki, wzdłuż łożyska naczyniowego, za ujściem bso. Gr do ok 6-8mm, echogeniczności nieregularnej, zmniejszonej, cechy ostre, bez typowego obrazu właściwego dla nowotworzenia/dla chłoniaka, do kontroli, obserwacji. Zatarcie, naciek zapalny zaostrzony w ich okolicy, zaostrzony w ok nerek, międzypętelowo bardziej przewlekły. Węzły chłonne zaotrzewnowe, w ok biodrowej przysrodkowej, gr do ok 3-4mm, zmienione zapalnie, przewlekłe. Śledziona nieznacznie powiększona, gr ok 12-13mm, brzegi odc pofaldowane, zawinięte, wzdłuż pasmo torebkowe, hyperechogenne, pogrubiałe. Echogeniczność miąższu zmniejszona niejednorodnie, zapalenie miąższu, ale bez cech ostro naciekowych, bez zmian rozrostowych, bez przebudowy ew typowej dla nowotworzenia, do kontroli. Bez

zastoju w krążeniu żylnym mięsistym, w łazysku naczyń. Bez wolnego płynu aechogenego w j otrzewnej.

Mięsistość trzustki pofałdowana, wzdłuż odcinkowo zauważalne pasmo torebkowe, hyperechogenne, gr do ok 8-8,5mm, echogeniczność mięsistości nieznacznie niejednorodna, zmniejszona, przewlekłe zapalenie mięsistości, komponenta obrzękowa, bez cech nasilonych przerostowych. Nieposzerzony przewód trzustkowy. Przewód pokarmowy ogólnie wypełniony bardzo znacznie treścią pokarmową, echogenna, zageszczona/płynna w żołądku, płynna przez j cienkie. Zgazowanie znaczne, w treści, przysięcinie, niejednorodnie. Odzwierciadlenie, ujście bso bez poszerzenia, w j grubym masy echogenne, zageszczone, jak uformowane, pasmo cienia akustycznego, gaz.

Bez ew cech typowych dla niedrożności przew pok, perystaltyka zauważalna, mieszana, raczej zaleganie treści w żołądku, także przez j cienkie? spowolnienie perystaltyki, szczeg przez odc początkowy przew pok, wyraźniejsza przez j cienkie. Poszerzenie odcinkowe światła j cienkiego ze wzgl na wypełnienie, zapalenie. Nieuwidoczne, w żołądku, przez j cienkie, twory, ew właściwe dla c.o., dające typowy cień akustyczny.

Widoczne odc ściany żołądka pofałdowane miejscowo, od wewn, zauważalna, zachowana strukturalność, komponenta przewlekła, zapalna, gr do 3-4,5mm, odcinkowo zatarcie nieznaczne. Odzwierciadlenie bez zauważalnych zmian, przez j cienkie ściana o zauważalnej strukturze, z odcinkowym zatarciem przewlekłym, z rozpuszczeniem, pofałdowaniem odcinkowo warstwy śluzowej, mniej mięsistej. Komponenta zapalna, przewlekła, gr ściany do ok 3-4mm. Niezauważalne zmiany naciekowo rozrostowe/nowotworowe, wyw się ze ściany przew pok. Bez typowego obrazu IBD, do kontroli.

Ujście bso zapalnie zatarte, przewlekłe, przez j grube ściana do ok 2-2,3mm, zatarcie przewlekłe.

Nerki znacznie zmienione, jak powiększone, ok 51-52x32-33mm, wokół obustronnie pasmo torebkowe, hyperechogenne, pogrubiałe. Strukturalność kora rdzeni zauważalna, pogrubiała, przerosnięta warstwa korowa, echogeniczność mięsistości niejednorodna znacznie, wzmożona, szczeg w ok posrodkowej, okolicy rdzeniowej, pewne pasmo zatartego zapalnie rąbka hyperechogenne, liczne pasma/zageszczenia silnie echogenne/tkankowe oraz liczne, nieregularne pasma tk hypoechogennej, śródmiąższowo, szczeg podtorebkowo. Komponenta drobnych pasm/ognisk hyperechogennych, śródmiąższowo, okolicy rdzeniowej, możliwe zwłóknieniowych.

Prawostronnie, wokółnerkowo, podtorebkowo, także na zewnątrz, zauważalne pewne pasma tkankowe hypoechogenne, naciekowe, do gr ok 3-4mm.

Obustronnie przebudowa mięsistości nasilona, zapalna, naciekowa ostra, obrzękowa, szczeg po str prawej, bardziej nasilona. Zatarcie zapalne zaostrome mięsistości, na granicy, przebudowa śródmiąższowa, możliwe kłębuszkowa, odmiedniczkowa. Komponenta zwłóknieniowa, zwyrodnieniowa/pozapalna, trwała. Bez cech ew dysplazji mięsistości.

Możliwe drobne mineralizacje wewn miedniczek, zachyłków nerkowych. Bez cech zastoju, nieposzerzone miedniczki, zachyłki nerkowe, moczowody bez zmian. Zapalny naciek wokółnerkowo, zaostromy, przebudowa mięsistości nerek do różnicowania, nawet z procesem choroby układowej/szczeg po str prawej, możliwy rozwijający się chłoniak? Perfuzja śródmiąższowo zachowana, współczynnik oporu znacznie pow normy, RI 0,84-0,86.

Nadnercza bez zmian rozrostowych. Pecherz moczowy wypełniony aechogenicznie, z licznymi zageszczeniami/pasmami echogenicznymi, tkankowymi, z licznymi drobnymi mineralizacjami, wolnopływającymi i przysięcinie, zaleganie mieszanego osadu. Ściana gr ok 2,4-2,5mm, zapalenie przewlekłe, rozpuszczenie przewlekłe warstwy śluzowej, wzmożenie jej echogeniczności, bez zmian rozrostowych. Ok ujścia, widoczny odc cewki moczowej bez zmian.

W j kl piersiowej niezauważalny wolny płyn aechogeny, mięsistość płucny ogniskowo, pasmowato, podopłucnowo o komponente zmniejszonej powietrzności, z ogniskami konsolidacji, cechy zapalne. Bez wyraźnych ognisk większej niedodmy. W ok śródpiersia, wzdłuż unaczynienia, dogłównie do mięśnia sercowego, zauważalne ww chłonne, pojedyncze, gr ok 6-7mm, owalne, niejednorodnej echogeniczności, zmienione zapalnie, naciekowo, z zaostreniem. Bez cech ew nowotworzenia chłoniaka.

Wskazanie do pełnego bad echokardiograficznego, możliwa kardiomiopatia przerostowa?

Kontrolne bad usg, nerki, przewod pokarmowy na czczo, ww chłonne, w zaleznosci od stanu klin, za tydzien?

lek wet ania zlot
604091338

06/10/2017 07:52: Badanie

Temperatura: 37,6°C

Waga: 3,69 kg

Opis wywiadu: Bez defekacji.

Je ale mniej chętnie niż zwykle.

Opis badania:

Osłabiony, letargiczny.

Przy prawym przednim nozdrzu podrażnienie skóry.

Zły stan jamy ustnej.

Pogrubiałe, zgazowane jelita.

Odwodnienie około 8 % w badaniu klinicznym.

Pobranie moczu do badania metodą punkcji.

W badaniu usg podejrzenie chłoniaka nerki.

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne

Kroplówka w czasie wizyty

Pobranie moczu

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Sol 250 ml NaCl:GLUKOZA 1:1 1 szt.

Dawkowanie: 150 ml i.v.

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.

CERENIA inj 0,2 ML

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,35 ML

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 0,5 AMP.

Ornipural 1 ml

Zalecenia:

- konsultacja kardiologiczna: dr Kraszewska 11/10/2017 g.20:30
- za tydzień kontrolne badanie usg jamy brzusznej: dr Czubaj 11/10/2017 g.16:30
- konsultacja neurologiczna: dr Sobczyński 17/10/2017 g.21:00
- Unidox 1/3 tabl 1 raz dziennie z jedzeniem do 9.10 włącznie
- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności
- ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu

- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)
 - szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań
- Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Maria Kłucjasz

06/10/2017 11:55: -

Zabiegi

Mocz + kreatynina

Zarejestrował: AA Laboratorium

06/10/2017 21:19: -

Zastosowane leki

Floxal krople do oczu 0,3% 5 ml 1 szt.

Zarejestrował: Animal Center

07/10/2017 09:58: Badanie

Temperatura: 37,5°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dużo lepsze

Apetyt zachowany

Po nocy nie oddał kału

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, źrenice reaktywne, bez anizokorii, powiększone węzły chłonne zuchwowe, podkolanowe w normie, rozpulchnione spojówki, stomatitis, kamień nazębny, kanały słuchowe bez zmian, osłuchowo bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.

CERENIA inj 0,2 ML

TOLFINE / 100 ML INJ. 0,35 ML

SOLVERTYL INJ.DOM.,DOŻ 25MG/ML5SZT 2 ML 0,5 szt.

NO-SPA INJ 0,04G/2ML 5 AMP. 0,5 AMP.

Sol 250 ml NaCl 1 szt.

Dawkowanie: 150 ml i.v.

COMBIVIT / FLAKON 100 ML 1 ML

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

08/10/2017 10:48: -

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Unidox solutab 100mg tab 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps
APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.
Sol 250 ml NaCl 1 szt.
Dawkowanie: 150 ml i.v.
COMBIVIT / FLAKON 100 ML 1 ML
Zarejestrował: Animal Center

09/10/2017 09:59: Badanie

Waga: 3,57 kg
Opis wywiadu: Samopoczucie dobre, ale jest mniej aktywny
Zjadł chętnie posiłek
Kał uformowany

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, rozpuszczone spojówki, stomatitis, kamień nazębny, osłuchowo bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne
Kroplówka w czasie wizyty

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.
Unidox solutab 100mg tab 1 szt.
BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps
APARAT TYP IS DO PRZETACZANIA PŁ. Z ŁĄCZ 1 szt.
Sol 250 ml NaCl 1 szt.
Dawkowanie: 150 ml i.v.
COMBIVIT / FLAKON 100 ML 1 ML

Zalecenia:

- konsultacja kardiologiczna: dr Kraszewska 11/10/2017 g.20:30
 - za tydzień kontrolne badanie usg jamy brzusznej: dr Czubaj 11/10/2017 g.16:30
 - konsultacja neurologiczna: dr Sobczyński 17/10/2017 g.21:00
 - w dalszej kolejności BAC nerek
 - Unidox 1/3 tabl do jutra włącznie i odstawiamy
 - Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie
 - krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności
 - ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu
 - kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)
 - szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań
- Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

10/10/2017 09:40: Badanie

Opis wywiadu: czuje się dobrze,
ma apetyt,
nie oddał kału, nie wymiotował

Opis badania:

temp 38,2

bez cech odwodnienia,

żrenice symetryczne, lekko rozpulchnione spojówki,

osłuchowo bez nieprawidłowości,

brzuch miękki, niebolesny, lekko zgazowane pętle jelit,

zdjęcie wenflonu

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

zalecenia:

jutro konsultacja kradiologiczna/USG - proszę aby Słonecznik zjadł jedynie śniadania - później 8h na czczo,

- konsultacja neurologiczna: dr Sobczyński 17/10/2017 g.21:00

- w dalszej kolejności BAC nerek

- dzisiaj podano ostatni UNIDOX

- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie

- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)

- Bioimmunex 1 kaps 1xdz

- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych

- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności

- ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu

- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)

- szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

10/10/2017 20:26: Badanie

Opis wywiadu: FeLV +, kot ostatnio gorzej się poczuł, osłabiony, widoczna anizokoria, po 24h kot się ożywił ale wciąż nieznaczna anizokoria.

Opis badania:

W badaniu neurologicznym:

Świadomość zachowana, normalna.

Porusza się bez deficytów.

Koraktura w normie we wszystkich kończynach.

Odruch grożenia obustronnie w normie

Czucie twarzy symetryczne w normie

Odruch powiekowy obustronnie w normie

Anizokoria

Odruch źreniczny prawy w normie, lewy osłabiony

Diagnoza:

Lokalizacja neuroanatomiczna: nc III/mm zwieracze żrenicy

Zalecenia:

- wskazana konsultacja okulistyczna, w przypadku wykluczenia przyczyn okulistycznych obserwacja, w razie pojawienia się dodatkowych objawów neurologicznych wskazane badanie MRI głowy.

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Jacek Sobczyński

11/10/2017 09:46: Badanie

Temperatura: 38,6°C

Opis wywiadu: apetyt w normie,
samopoczucie dobre,
kał uformowany,
mocz oddaje do kuwety,

koniec unidoxu

Opis badania:

anizokoria, spojówki lekko rozpulchnione, błony śluzowe różowe, ww chłonne żuchwowe w normie, osłuchowo bez nieprawidłowości, brzuch miękki, niebolesny

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

BIOPROTECT 60 KAPS. 1 kaps

Zalecenia:

- konsultacja kardiologiczna dzisiaj

- konsultacja okulistyczna 18/10

- w dalszej kolejności BAC nerek

- Bioprotect 1 kaps 1 raz dziennie

- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)

- Bioimmunex 1 kaps 1xdz

- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych

- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności

- ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu

- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)

- szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

11/10/2017 19:37: Badanie

Opis wywiadu: Pacjent skierowany na konsultację kardiologiczną.

Opis badania:

W badaniu klinicznym błony śluzowe różowe, wilgotne, CRT 1s, węzły chłonne dostępne do badania niepowiększone, kaszel reakcyjny ujemny.

Brak patologicznych szmerów sercowych i oddechowych. Tętno na tętnicach udowych dobrze wyrażone, miarowe.

WYNIK BADANIA ECHOKARDIOGRAFICZNEGO

POMIARY LEWEJ I PRAWEJ KOMORY KOMORY W M-MODE

Światło prawej komory w rozkurczu (RVDd) - 0,36 cm,

Grubość przegrody międzykomorowej w rozkurczu (IVSd) - 0,49 cm, grubość przegrody międzykomorowej w skurczu (IVSs) - 0,7 cm

światło lewej komory w rozkurczu (LVDd) - 1,8 cm, światło lewej komory w skurczu (LVDs) - 1,02 cm

grubość ściany wolnej lewej komory w rozkurczu (PWd) - 0,38 cm, grubość ściany wolnej lewej komory w skurczu (PWs) - 0,7 cm

frakcja wyrzutowa (EF) - 78 %, frakcja skracania (FS) - 44 %

POMIARY W PREZENTACJI 2D

światło aorty (Ao) - 0,87 cm, światło lewego przedsionka (LA) - 1,07cm, LA/Ao - 1,23

POMIARY W OBRAZIE DOPLEROWSKIM

LVOT prędkość przepływu przez aortę - 1,0 m/s, gradient ciśnienia - 4,0 mmHg

RVOT prędkość przepływu przez tętnicę płucną 0,9 m/s, gradient ciśnienia - 3,9 mmHg

Wnioski:

Wielkość lewej i prawej komory prawidłowe, grubości ściany wolnej lewej komory oraz przegrody międzykomorowej bez zmian stosownie do masy ciała, wielkość lewego przedsionka prawidłowa, funkcja skurczowa lewej komory zachowana.

Zastawki mitralna oraz trójdzielna bez zmian i bez niedomykalności. Przepływy przez aortę i tętnicę płucną prawidłowe. Odległość płata zastawki mitralnej od przegrody w normie.

Brak wad wrodzonych i chorób nabytych.

Zabiegi

[Echo serca](#)

Zarejestrował: lek.wet. Katarzyna Kraszewska

12/10/2017 10:47: Badanie

Temperatura: 38,5°C

Opis wywiadu: Czuje się dobrze, apetyt zachowany, po nocy w kuwecie uformowana kupa.

Na kocyku ślad jak po wymiocinach.

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, wilgotne crt2s. Stan jamy ustnej bez zmian w porównaniu do poprzedniego badania.

Spojówki rozpułchnione, różowe, węzły chłonne podżuchwowe powiększone.

Kanały słuchowe bez zmian.

Osluchowo bez nieprawidłowości.

Jama brzuszna miękka, niebolesna, pętle jelit pogrubiałe z przelewającą się treścią, nerki powiększone.

Zabiegi

[Pobyt doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- konsultacja okulistyczna 18/10

- w dalszej kolejności BAC nerek

- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)

- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności
 - ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu
 - kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)
 - szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań
- Zarejestrował: lek. wet. Aleksandra Ignaczak

13/10/2017 15:22: Badanie

Opis wywiadu: Czuje się dobrze.

Bez wymiotów.

Apetyt.

Opis badania:

Bardzo zły stan jamy ustnej.

Brzuch miękki, niebolesny.

Powierzchowne węzły chłonne niepowiększone.

Zabiegi

Pobyt doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- konsultacja okulistyczna 18/10
 - w dalszej kolejności BAC nerek
 - krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności
 - ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu
 - kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)
 - szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań
- Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Maria Kłucjasz

13/10/2017 15:45: -

Zalecenia:

- badanie usg 16/10

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Maria Kłucjasz

14/10/2017 11:10: Badanie

Temperatura: 37,5°C
Opis wywiadu: Apetyt w normie
Kał i mocz oddaje normalnie
bez wymiotów, biegunki
Mruczy przy badaniu
nieco osowiały

Opis badania:

kamień nazębny, ww chłonne niepowiększone, osłuchowo w normie, brzuch miękki, niebolesny, anizokoria

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- konsultacja okulistyczna 18/10

- Usg 16/10

- w dalszej kolejności BAC nerek

- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)

- Bioimmunex 1 kaps 1xdz

- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych

- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności

- ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu

- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) najwcześniej 2 tyg po zakończeniu leczenia (ok 23.10)

- szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

15/10/2017 19:55: -

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: Animal Center

16/10/2017 11:48: Badanie

Temperatura: 37,4°C
Waga: 3,62 kg
Opis wywiadu: Samopoczucie dobre
Apetyt zachowany
Kał uformowany
Po nocy wymioty z obecnością sierści

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, anizokoria, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w

normie, rozpulchnione spojówki, stomatitis, kamień nazębny, osłuchowo bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe, zgazowane pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- konsultacja onkologiczna 17.10 (BAC nerek???)
- konsultacja okulistyczna 18.10
- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności
- ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) 23.10
- szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

17/10/2017 12:03: Badanie

Opis wywiadu: skierowany na konsultację onkologiczną ,
ze względu na podejrzenie chłoniaka nerek ,

Opis badania:

w badaniu klinicznym ogólnym :

b.śluzowe jasnoróżowe, crt > 2 sek , znacznego stopnia kamień nazębny ,
jama brzuszna miękka, nerki , nieznacznie tkliwe , zmienione palpacyjnie ,
wykonano FNA pod kontrolą USG nerek ,
dalsze decyzje po wynikach biopsji

Diagnoza: susp lymphoma , FNA

Zabiegi

Konsultacja onkologiczna I 0,8

CYTOLOGIA - SGGW

Zarejestrował: lek.wet. Tomasz Dominiak

17/10/2017 15:37: Badanie

Opis wywiadu: premedykacja do FNA nerek

nerki obustronnie zmienione, jak powiększone, przebudowane trwale, zatartej granicy kora/rdzeń, pogrubieniu kory i
podwyższeniu jej echogeniczności, obecności pasm hipo oraz hiperechogenicznych,
susp.chłoniak

Opis badania:

dzisiaj wieczorem mały posiłek

Zabiegi

Premedykacja I

USG w czasie wizyty

[Pobyć doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Dexdomitor 0,1 ml

Butomidol / inj 10 ml 0,1 ml

WENFLON NIEBIESKI 1 szt.

Inne materiały 1 szt

SOL 100ml NaCl 1 szt.

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zarejestrował: lek.wet. Norbert Czubaj

18/10/2017 12:01: Badanie

Opis wywiadu: Konsultacja okulistyka

Opis badania:

Odruch grożenia zachowany w obu oczach , odruch powiekowy zachowany obustronnie odruch źreniczny bezpośredni i pośredni zachowany w obu oczach.

Test fluoresceinowy ujemny w obu oczach.

IOP L 14 mmHg , IOP P 15 mmHg

Źrenica D obustronnie, porażenie gałązki n. rzęskowego wtórnie do FeLV.

Dno oka lewego i prawego bez uchwytanych zmian.

Zabiegi

[Wizyta pierwsza](#)

Zalecenia:

Brak wskazań do leczenia okulistyka

Zarejestrował: lek.wet. Oliwia Łobaczewska

18/10/2017 12:08: Badanie

Temperatura: 37,5°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Kału nie oddał

Zjadł

Dużo śpi

Zdjęto wenflon

Opis badania:

śluzówki różowe, ww chłonne żuchwowe w normie, anizokoria, kamień nazębny, osłuchowo bez nieprawidłowości, brzuch miękki, jelita nieco zgasowane

brak wskazań do leczenia okulistyka

Diagnoza: FeLV

Podejrzenie chłoniaka nerek

Źrenica D obustronnie, porażenie gałązki n. rzęskowego wtórnie do FeLV

Zabiegi

[Pobyć doba bezdomne](#)

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- czekamy na wynik BAC nerek -> zależnie dalsze zalecenia

- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)

- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów w dalszej kolejności
- ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) 23.10
- szczepienie Purevax RCPCh ok 23.10 jeśli bez p/wskazań

Zarejestrował: lek.wet. Karolina Papakul

19/10/2017 10:21: Badanie

Temperatura: 38,0°C

Opis wywiadu: Samopoczucie dobre

Apetyt zachowany

Wzmoczone pragnienie

Kał uformowany

Opis badania:

Błony śluzowe różowe, czas kapilarny 1,5 sek, anizokoria, powiększone węzły chłonne żuchwowe, podkolanowe w normie, stomatitis, kamień nazębny, osłuchowo bez patologicznych szmerów, brzuch miękki, nie bolesny, powiększone nerki, pogrubiałe, zgazowane pętle jelit

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt

Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- czekamy na wynik BAC nerek -> zależnie dalsze zalecenia
- krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
- Bioimmunex 1 kaps 1xdz
- interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
- sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów oraz kastracja w dalszej kolejności
- ze względu na stan zdrowia przerwa w odrobaczaniu
- szczepienie Purevax RCPCh jeśli bez przeciwwskazań
- kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) 23.10

Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Agnieszka Zielonka

20/10/2017 10:27: Badanie

Temperatura: 37,4°C

Opis wywiadu: Kał miękki, uformowany, bez wymiotów.

Ma apetyt.

Opis badania:

Letargiczny.

Zły stan jamy ustnej.
Nieznacznie powiększone węzły chłonne podżuchwowe.
W badaniu palpacyjnym nerki niebolesne.
Anizkokoria - zmiany neurologiczne wtórne do FeLV.
Podano krople do oczu yellox.
Brak wciąć wyników badania biopsyjnego.
Diagnoza: FeLV, podejrzenie chłoniaka nerek

Zabiegi

Pobył doba bezdomne

Zastosowane leki

Inne materiały 1 szt
Bioimmunex felis 40 kaps 1 szt.

Zalecenia:

- czekamy na wynik BAC nerek -> zależnie dalsze zalecenia
 - krople do oczu : Yellox przez 4 tyg (do 30.10)
 - Bioimmunex 1 kaps 1xdz
 - interferon alfa 1 ml 1xdz w seriach tygodniowych
 - sanacja jamy ustnej z ekstrakcją zębów oraz kastracja w dalszej kolejności
 - 23/10 wracamy do odrobaczania jeśli stabilny stan ogólny
 - kontrolne badanie krwi w kierunku Mycoplasma felis (PCR) 23.10
 - szczepienie Purevax RCPCh jeśli bez przeciwwskazań
- Zarejestrował: spec. chorób psów i kotów Maria Kłucjasz

Podpis lekarza weterynarii